

(十)

(姚夢石)

家庭固有良藥

小兒風痰急症治療方

李健恒

凡家庭之間。無論貧富。必有普通良葯幾種。此良藥者。即日常生活及食物所用之物。可利用之爲葯劑者。然常人每習焉不察。以其無醫學知識故也。不知救病之良藥。各家中皆有之。人苟有此等知識。則雖處於荒僻之地。而近處無藥舖者。或病者值危急之秋。而醫治刻不及待者。自不致束手無策矣。茲舉家庭固有之物。可爲葯劑者。列之如左。

一、砂糖。砂糖有退熱之功用。各種熱病發熱之際。可用砂糖一錢。溶於水中飲之。則體熱可略減。其性又能刺激腸胃而助消化。故可用之爲消化劑。多食砂糖。能清潔胃腸。故積食者可服之。人飽食後。腹中不舒。以砂糖一錢溶

小兒肝胃衰弱。消化不良。易罹風痰之症。其因胃積生痰。肝動生風。風痰上湧。窒塞肺管。阻滯氣道之升降。故雲時四肢掣急。兩目上吊。口開唇反。危在頃刻。西醫不知是痰。乃指腦病。專投安腦麻酔之藥。如銀臭續續緣冰臭刺等……而其頑痰窒塞者。不之間也。何異膠漆拔背。以是不能取效。鄙人發明一方。用之最靈。誠有勝於西藥之却痰劑。謹錄於下。川貝母五分。異硃砂三分。天竹黃四分。陳皮三分。南星五分。薄荷葉五分。青礬石八分。蘇絡珠一分。殭蠶二尾。沉香四分。風化霜四分。共研爲極細末。藏於玻璃瓶裡。隨急之時。用一錢。開水沖。灌服自愈。

之女青之切青

遺精避免法
滑精特效方
▲手淫防止法
▲早洩求子法
▲陽萎自療法
▲脫陽急救法
▲夾陰攝寒方

▲急性白濁方	▲楊梅結毒方	▲精滑遺精子方	▲正偏
▲久不除根方	▲毒性喉疳方	▲可避惡毒術	▲男婦
▲久帶必止方	▲梅毒癰疽方	▲天然解毒法	▲男婦
▲女子夢交方	▲性慾節制法	▲心理和病法	▲男婦
▲防免白濁法	▲五室癰疽方	▲疝氣簡驗方	▲男婦
▲下疳特效藥	▲疳疔癰疽方	▲少年男嬰方	▲男婦
▲橫痃內消法	▲遠風驗方	▲豐發雀斑方	▲男婦

(續)

(汪蔭成)

發臭。可用饅頭或芝麻粉合炭末爲軟膏。敷於瘡面。又如濕瀉、胃不消化、噎氣者。可用炭粉一分至一錢。加砂礬拌和。用水冲服。（按我國習俗食積服山楂末飯灰等亦炭質也惟知其法而不知其理耳）

中植物質之毒。卽動物物之骨肉。使其變成動物炭。研細服之。其毒自解。一、薑 無論鮮者與乾者。皆有燥熱。以之浸酒。或製成糖薑。可治食物不消化之病血滯身冷。及腹痛氣脹。均可服之。又喉痛及胸痞等。將薑搗爛外敷。能消炎止痛。

久病之人。吐痰無血。淚淚乃血中。實血何非痰也。血。以其狀似痰。無淚。乃在其下。一夜色變紅矣。此淚出於胃。而胃火沸騰於咽喉。不得不吐。者也。雖是白沫。而實胃中之精。豈特血而已。苟不速治。則白沫變爲綠痰。已成絕症。無法圖治矣。鼻血爲病。或風邪客肺。肝火上冲。以出鼻紅。內經云。肺氣通於鼻。是明理也。出於後陰。尿血出於前陰。最難調治。然總之出血於下也。蓋大小便各有經絡。而其證皆因膀胱之熱也。婦女交孕。血先期而來。是血分有熱也。或月事落後。血虛氣滯也。或經期相差數者。乃血虛肝氣之鬱結也。夫經水出於腎。而肝爲腎之子。肝鬱則腎亦鬱矣。子母相閉。子病而母亦隨之。總言之。凡月事不調。歸經。或上或下。或四股毛發各處出之。循行經絡。外行於皮毛。中行於臟腑。內行於筋骨。上行於頭目兩手。下行於二便一臍。周身無非血絡。有濁則非血。有孔則膿。有濁則非血。甚則嘔吐。或露於二便。或見於皮毛。或顯於齒縫。或滲於腠理。皆宜順其性以歸經源。

翻
(十八)

延胡索	艾葉	川芎	茵苳	威靈仙	稀莖草	羌活	紫蘇	前胡	羌活	獨活	
辛溫而溫氣勝宜	辛溫而溫氣血兼宜然其氣最勝宜親炙	辛溫升浮其性極烈宜爲膏	辛苦微溫以氣勝宜膏	辛鹹而溫性極烈宜爲膏	辛甘宜散古人多熬爲膏以爲服食之品故宜膏	辛苦宜散古人多熬爲膏以爲服食之品故宜膏	辛溫宜透以氣勝宜膏	辛甘微寒辛氣分藥也與柴胡同能治兩	辛甘升宜氣味俱烈宜膏	辛溫芳香辛氣分藥宜膏	辛溫芳香辛氣分藥宜膏

附子 辛甘大熱其性猛烈無比宜爲膏
草烏頭 辛苦大熱性更烈于川烏宜爲膏
白附子 辛甘大熱宜爲膏
破故紙 苦溫補陽氣分药也宜膏
胡蘆巴 辛苦大熱宜爲膏
蛇床子 辛苦而溫祛風燥濕助陽氣分藥
仙茅 辛熱氣分藥宜膏
砂仁 辛熱以氣勝宜膏
砂仁 辛溫氣分之藥宜膏
白芷 辛熱氣分藥宜膏
肉豆蔻 辛熱香燥以氣勝宜膏
草果 辛熱香燥以氣勝宜膏
性平氣香味辛微甘苦長于宣解以
香附 宜膏
木香 辛苦而溫以氣勝宜膏
藿香 辛甘微溫以氣勝宜膏
薑黃 溫熱以氣勝宜膏
良薑 辛熱以氣勝宜膏
甘松香 辛溫芳香以氣勝宜膏
山柰 辛溫以氣勝宜膏
草撥 辛熱以氣勝宜膏
白藜皮 氣寒味苦性通而燥以味勝宜膏